

แบบคัดกรองผู้มารับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

ชื่อ-สกุล

HN.....

ที่อยู่

.....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง [] ตามความเป็นจริง เพื่อเจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่า ท่านสามารถฉีดวัคซีน ได้หรือไม่

มีประวัติแพ้ยา / วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก / อาหาร / สารอื่นๆ [] ใช่ [] ไม่ใช่

กำลังมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน [] ใช่ [] ไม่ใช่

เพิ่งนอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาล ไม่เกิน 14 วัน [] ใช่ [] ไม่ใช่

เพิ่งหายจากการเจ็บป่วยเฉียบพลัน มาไม่เกิน 7 วัน [] ใช่ [] ไม่ใช่

มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือมักมีอาการ เจ็บแน่นหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่น หรือยังอยู่ระหว่างควบคุมอาการของโรคประจำตัว [] ใช่ [] ไม่ใช่

คำแนะนำในการดูแลภายหลังฉีดวัคซีน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้รับวัคซีนแล้วท่านอาจมีอาการ ไข้ ปวดบวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด แต่ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง หากท่านมีอาการ หลังฉีดวัคซีนเหล่านี้ ควรปฏิบัติตน ดังนี้

- ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด ในระยะ 24 ชั่วโมงแรกหลังฉีด หากมีอาการปวดมาก ให้ใช้น้ำเย็นประคบ และให้รับประทานยาแก้ปวด ตามคำแนะนำของแพทย์

ผู้ที่ฉีดวัคซีนบางรายอาจมีอาการปวดบวมที่แขนบริเวณที่ฉีดลามไปถึงบริเวณหัวไหล่ ข้อศอก หรือทั้งแขน อาการเช่นนี้ เกิดจากการที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคบาดทะยักในระดับสูง อาการดังกล่าวไม่มีอันตรายแต่อย่างใด เป็นอาการที่พบได้น้อย สามารถรักษาให้หายได้และไม่มีผลแทรกซ้อนในระยะยาว

- สำหรับผู้ที่มีไข้ต่ำๆ ให้เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดา โดยเฉพาะบริเวณซอกคอ ข้อพับต่างๆ ควรเช็ดมากๆ เพื่อช่วยพาความร้อนออกจากร่างกาย และอาจให้รับประทานยาลดไข้ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์

คอตีบ - บาดทะยัก

โรคร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



ท่านสามารถรับบริการวัคซีนได้ที่

“ คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ”

ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านท่าน



ด้วยความปรารถนาดีจาก..

คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา

โทร.044-922682

ผู้ใหญ่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนด้วยหรือ ???

หลายคนอาจคิดว่าวัคซีนใช้ในการป้องกันโรคสำหรับเด็กเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ววัคซีนมีประโยชน์ในการป้องกันโรคสำหรับคนทุกวัย จากการระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ ในปี 2556 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีระดับภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคให้สูงพอที่จะป้องกันโรคได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้ผู้ใหญ่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก (dT) ทุกๆ 10 ปี ภายหลังจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ขวบปีแรก และได้รับวัคซีน dT เมื่ออายุ 12 ปี นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับบาดแผลสกปรกที่อาจปนเปื้อนเชื้อบาดทะยักและหญิงตั้งครรภ์ก็ควรได้รับวัคซีนนี้เช่นกัน

การฉีดวัคซีนนี้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแล ตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อนฉีด หลังการฉีดวัคซีนควรพักบริเวณจุดให้บริการเป็นเวลา 30 นาที เพื่อเฝ้าดูอาการให้แน่ใจว่าไม่มีการแพ้รุนแรง จึงกลับบ้าน

หากท่านเคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก, วัคซีนชนิดอื่น, ยา, อาหารหรือสารต่างๆ ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนให้วัคซีน

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2559
กลุ่มเด็กโต กลุ่มผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ต้องได้รับบริการวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก (dT) 1 ครั้ง ทุก 10 ปี

โรคคอตีบและบาดทะยักเป็นอย่างไร

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทำให้มีการอักเสบและทำให้เกิดเนื้อตายเป็นแผ่นหนาในลำคอหรือหลอดลมตีตันของทางเดินหายใจ

อาการของโรคเริ่มต้นด้วยไข้ต่ำๆ มีอาการคล้ายหวัดในระยะแรก มีอาการไอ ก้อง เจ็บคอ เบื่ออาหาร ต่อมา มีแผ่นฝ้าขาวอมเทาติดแน่นบริเวณทอนซิล ช่องคอ โพรงจมูก กล้องเสียง บางรายที่รุนแรงจะมีอาการตีตันของทางเดินหายใจจนหายใจไม่ได้ พิษของเชื้ออาจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง บริเวณกล้ามเนื้อตา แขนขา กระบังลม และอาจเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตทำงานผิดปกติ เชื้อจะแพร่มาจากลำคอของผู้ที่เป็นพาหะจากการไอจามรดกัน หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิด หรือการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ จานชาม ช้อน เป็นต้น

โรคบาดทะยัก เกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มักเข้าร่างกายทางบาดแผล ทำให้มีอาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อ ขากรรไกร อ้าปากไม่ได้ รับประทานอาหารลำบาก หายใจลำบาก รุนแรงจนเสียชีวิตได้ เชื้อบาดทะยักมีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม

โรคคอตีบและบาดทะยัก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนโรคคอตีบและบาดทะยัก เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ทำมาจากพิษของเชื้อที่ทำให้หมดความสามารถในการก่อโรคโดยผ่านขบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคที่มีชีวิตหลงเหลืออยู่

ผู้ใหญ่ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักทุกคน โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

- บุคคลที่ได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนครบ 5 ครั้ง เมื่อวัยเด็กและได้รับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก 1 ครั้ง เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (12 ปี) ให้วัคซีน 1 ครั้ง เมื่ออายุ 20 ปี จากนั้นกระตุ้นซ้ำ 1 ครั้ง ทุก 10 ปี
- บุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยักมาก่อน หรือไม่ครบ 3 ครั้ง ต้องให้วัคซีนจนครบ 3 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 0,1,6 เดือน เป็นชุดแรก หลังจากนั้นกระตุ้นซ้ำ 1 ครั้ง ทุก 10 ปี
- บุคคลที่ไม่ทราบประวัติ/จำประวัติการได้รับวัคซีนคอตีบไม่ได้ ควรให้วัคซีนจนครบ 3 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 0,1,6 เดือน หลังจากนั้นกระตุ้นซ้ำ 1 ครั้งทุก 10 ปี ในกรณีที่มีอาการปวดบวมที่แขน บริเวณที่ฉีดลามไปถึงบริเวณหัวไหล่ ข้อศอก หรือทั้งแขน ให้ยุติการให้วัคซีนครั้งต่อไปและกระตุ้นซ้ำทุก 10 ปี

